

## **abmoosen**

Durch **Abmoosen** (Absenken) zum Bonsai

Ein durch Mäuse stark beschädigter, unterer Stammbereich wird nach dem **Abmoosen** vom oberen Stamm- und Kronenbereich abgetrennt.

[http://www.bonsaiclub.ch/design.php?action=fachbereich&kat\\_id=28](http://www.bonsaiclub.ch/design.php?action=fachbereich&kat_id=28)

abmoosen

### **Durch Abmoosen (Absenken) zum Bonsai**



Ein durch Mäuse stark beschädigter, unterer Stammbereich wird nach dem Abmoosen vom oberen Stamm- und Kronenbereich abgetrennt. Danach wurde der obere Stammbereich mit den neuen, feinen Würzelchen eingepflanzt und zu einem schönen Bonsai herangezogen. Interessante Stamm- oder Astpartien von Bäumen (z.B. Kiefern, Wacholder, Birken und Buchen) lassen sich durch Abmoosen und Absenken des gewählten Baumabschnittes zu eigenständigen Pflanzen (später Bonsai) heranziehen. Bei dieser Vermehrungsmethode sind die Aussichten, einen gut geformten Bonsai-Rohling zu erhalten, am besten. Schliesslich kann man den optimalen Stamm- oder Astabschnitt an der Mutterpflanze selbst auswählen. Die Wurzeln bilden sich beim Ableger rund um die Trennstelle herum.